

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百五十二

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄錄監生臣林大本

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十二

明

周王朱橚撰

熱病門

總論

夫熱者皆傷寒之類也冬傷于寒至春變為溫病至夏變為暑病者熱重于溫也肝熱病者小便赤黃腹痛多卧身熱熱盛則狂言多驚兩脇滿痛手足熱躁不能安卧心熱病者先不樂數日乃熱熱盛則卒心痛煩熱欲

嘔頭痛面赤無汗脾熱病者先頭重煩痛心煩欲嘔身
熱熱盛則腰痛腹滿澹泄肺熱病者先淅淅然毛起惡
風舌上黃身熱熱盛則喘歔背不得大息頭痛不汗
出而寒腎熱病者先腰痛脰痠大渴數飲水身熱熱盛
則項痛而強脰寒足下熱不欲言肝熱病者左頰赤心
熱病者面赤脾熱病者唇先赤肺熱病者右頰赤腎
熱病者頤先赤病雖未發見色者療之名曰治未病一
日汗不出大泄發者死二日泄而腹滿甚者死三日目

不明熱不已者死四日老人嬰兒熱而腹滿者死五日
汗不出嘔血者死六日舌本爛熱不已者死七日欬血
而衄汗出不至足者死八日髓熱者死九日熱而瘵者
死凡有此候者皆不可治也熱病已得汗脉靜者生脉
躁者難治熱病脉常盛躁而不得汗者此陽之極也得
汗者生不得汗者難差熱病已得汗脉上躁喘且即復
熱喘盛者死熱病七八日脉不躁不數後三日當有汗
若不汗者難治熱病七八日其脉微小者生脉代舌焦乾

黑者死熱病已得汗常熱不去脉靜者生脉躁者難治
熱者脉常躁此氣之極也亦死熱病腹滿常喘熱不退
者死熱病多汗脉虛小者生緊實者死矣 又云熱病
者皆傷寒之類是也或愈或死皆以六七日之間其餘
以十日以上者何不知其解願聞其故岐伯曰巨陽者
諸陽之屬也其脉連于風府故諸陽主氣也人之傷寒
也則為病熱熱雖甚不死其兩感于寒而病必不能免
于死矣帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故

頭項疼腰背強二日陽明受之陽明主肌肉其脉夾鼻
絡于目故身熱目痛鼻乾不得卧也三日少陽受之少
陽主膽其脉循脇絡于目故胃脇痛而耳聾三陽經絡
皆受其病而未入于藏故可汗而已四日太陰受之太
陰脉布胃中絡于嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之
少陰脉貫腎絡于肺系于舌本故口燥舌乾而渴六日
厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三
陽五藏六府皆受病榮衛不行五藏不通則死矣其不

兩感于寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰
身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹
減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已
而嚏十二日厥陰病衰囊縱小腹微下大氣皆去病日
已矣帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病日衰
矣未滿三日可汗而已其滿三日可下而已

熱病一日

論

夫熱病一日病在太陽主表表胃皮膚也病在皮膚之間故頭項腰脊皆痛宜汗之則愈也

方

解肌散

出聖惠方

治熱病一日頭痛身熱四肢煩疼宜服

麻黃

去根節

川升麻

甘草

炙微赤剉

赤芍藥

柴胡

去苗

桔梗

去蘆頭

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃各一兩

右為粗散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

石膏散

出聖惠方

治熱病一日頭痛壯熱宜服

石膏

麻黃

去根節各二兩

黃芩

桂心

赤芍藥

柴

胡

去苗各一兩

右為粗散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

葛根散

出聖惠方

治熱病一日頭痛項強身熱如火宜服

葛根

剉

赤芍藥

麻黃

去根節

石膏

各二兩

白芷

柴

胡

去苗

黃芩

桂心

各一兩

右為粗散每服四錢以水一大盞入蔥白五寸生薑

半分煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗

柴胡散

出聖惠方

治熱病一日頭痛壯熱煩悶宜服

柴胡

去苗

赤芍藥

葛根

各一兩

梔子仁

黃芩

各半兩

石膏

二兩

右為散每服四錢用水一大盞蔥白二莖豉半合煎

至五分去滓不計時候溫服

梔子散

出聖惠方

治熱病一日頭痛壯熱心中煩悶宜服

梔子仁

黃芩

各三分

石膏

葛根

剉

柴胡

去苗

麥門

冬

去心焙各一兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入豉五十粒葱白

二莖煎至五分去滓不計時候溫服

麻黃散

出聖惠方

治熱病一日頭痛壯熱宜服

麻黃

一兩去根節

川大黃

三分剉碎微炒

黃芩

桂心

甘草

炙微赤剉

赤芍藥

各半兩

右為細散每服不計時候以新汲水調三錢服後蓋

衣取汗未汗再服

治熱病一日壯熱頭痛宜服

出聖
惠方

甘草

一兩炙
微赤對

生薑

三分切

蘇蘇

二枚大者細
對梔中盛之

右先將甘草生薑以酒一大盞半煎至八分去滓熱
投入蘇蘇梔中絞取汁不計時候分溫二服衣覆取
汗

桃柳湯浴方

出聖
惠方

治熱病一日身體壯熱頭痛骨肉

痠楚背脊強口鼻乾手足微冷小便赤黃宜用

桃枝并葉

五斤
細剉

柳枝并葉

五斤
細剉

右以水一石煮取一斗去滓帶熱避風處淋浴浴後于
密室中刺頭并眼後兩邊及舌下血斷以鹽末塗針
處便宜服葛豉粥

葛豉粥方

出聖
惠方

葛根

二兩
剉

葱白

五莖并
續白

豉

一合生薑

一兩
切

右藥以水三大盞煎至一盞半去滓下粳米二合煮
作粥乘熱頓服衣蓋取汗

麻黃粥方

出聖惠方

治熱病一日宜服發汗

麻黃

一兩去根節

豉

半合

右藥用水一大盞半煎至一盞去滓下粳米半合煮作稀粥乘熱頓服衣蓋取汗

治熱病疫毒病一日兩日頭痛壯熱渾身發熱如火眼目昏眩項背強急診其脉寸口浮數總三部俱浮數宜發汗若洪大緊急有骨力即不可汗也但熱病疫毒病不可以時日為定只看脉氣可汗即汗可取即取不可

差誤凡陽毒傷寒三日後其用藥取病與治熱毒疫病只一般也惟初間兩日所治小有不同但傷寒在表須當發之熱病疫毒病往往有不須發也若見得不仔細須俟三日後方可下疏藥也

治疫毒在表發汗方

萬金護命方

麻黃

去根三分

牡丹皮

去心

桔梗

羌活

獨活

細辛

荊芥穗

各一分

右細杵羅為末每服五錢水一椀椒五十粒茶末半

錢煎取濃汁用調下藥末非時和滓喫厚蓋衣被發
大汗一服安効

治時行熱病初得

本
草

以恭菜搗絞汁飲之得差

熱病二日

論

夫熱病二日陽明受病病在肌肉故內熱鼻乾不得眠
也故可瘳膏火灸發汗而愈也

方

麻黃散

出聖惠方

治熱病二日頭痛壯熱肢節不利宜服

麻黃

二兩去根節

川大黃

剉碎微炒

葛根

剉

桂心

柴胡

去苗

赤芍藥

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候熱服衣蓋取汗

前胡散

出聖惠方

治熱病二日口苦咽乾頭痛壯熱宜服

前胡

去蘆頭

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃各一兩

葛根

剉

桂心

旋覆花

各半兩

麻黃

二兩去根節

右為粗散每服五錢以水一大盞入生薑半分葱白五

寸煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

桂枝散

出聖惠方

治熱病二日頭痛壯熱宜服

桂枝

葛根

赤芍藥

甘草

炙微赤剉

杏仁

湯浸去皮尖雙

仁麴炒微黃各半兩

麻黃

三分去根節

石膏

一兩

右為粗散每服三錢水一中盞入葱白五寸生薑半

分煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再

服

柴胡散

出聖惠方

治熱病二日頭痛口苦雖經發汗未解

可服

柴胡

去苗

人參

去蘆頭

甘草

炙微赤剉

黃芩

赤茯苓

各一兩

半夏

半兩湯洗七遍去滑

右為粗散每服三錢以水一中盞入葱白五寸生薑

半分煎至六分去滓不計時候溫服令自有汗即解

黃芩散

黃芩

三分

麻黃

去根節

石膏

各一兩

川大黃

剉碎微炒

葛根

剉

桂心

赤芍藥

甘草

炙微赤剉

川朴硝

各半兩

右為細散每服不計時候以葱豉湯調下二錢衣蓋

取汗未汗再服

治熱病二日發汗未解頭痛壯熱宜服此方

出聖惠方

麻黃

去根節

甘草

炙微赤剉

葛根

各一兩

右細剉和勻分為六服每服以水一大鍾入生薑半

分煎至五分去滓不計時候熱服衣蓋取汗

治熱病二日發汗後不解頭痛體熱宜服此方

出聖惠方

石膏

一兩細研

麻黃

半兩去根節

甘草

一分炙微赤剉

右並剉用水一大盞煎至五分去滓入雞子白一枚攪勻不計時候乘熱頓服衣蓋取汗未汗再服

熱病三日

論

夫熱病三日諸陽傳病訖病猶在表未入于臟故胃脇痛而耳聾可發汗而愈也

方

葛根散

出聖
惠方

治熱病三日未得汗壯熱煩惱欲得飲

水宜服

葛根

剉

川大黃

剉碎
微炒

黃芩

桂心

赤芍藥

紫

胡

去苗各
一兩

麻黃

二兩去
根節

梔子仁

甘草

炙微赤剉
各半兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候熱服令有汗為度

大黃散

出聖
惠方

治熱病三日發汗未解頭痛口乾心胃

煩悶宜服

川大黃

剉碎
微炒

柴胡

去苗

麻黃

去根節
各一兩

秦艽

一兩半
去苗

石

膏二甘草

半兩炙
微赤剉

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分去滓
不計時候稍熱頻服汗出為度

柴胡飲子

出聖
惠方

治熱病三日頭痛口苦寒熱往來宜

服

柴胡

去苗

木通

剉

赤芍藥

各一
兩半

石膏

二兩
半搗

甘草

半兩
炙微

赤
剉

右為細剉和勻每服半兩用水一大盞煎至五分去

滓不計時候溫服

麻黃散

出聖
惠方

治熱病三日頭疼壯熱宜服

麻黃

去根
節

知母

葛根

各一
兩

赤芍藥

一兩
半

黃芩

甘草

炙微
赤剉

白藥子

梔子仁

細辛

柴胡

去苗
各半

石膏

二
兩

右為粗散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候稍熱服衣蓋取汗

發汗桂心散

出聖惠方

治熱病三日表猶未解壯熱頭目

四肢不利宜服

桂心

赤茯苓

澤瀉

赤芍藥

各半兩

柴胡

去苗葛

根剉

麻黃

去根節各一兩

甘草

一分炙微赤剉

右為粗散每服五錢以水一中盞入薄荷二七葉煎

至六分去滓不計時候稍熱服衣蓋取汗未汗再服

苦參散

出聖惠方

治熱病三日解毒氣

苦參

一兩
剉

黃芩

二兩

甘草

半兩炙
微赤剉

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至六分去滓入

生地黄汁一合攪令勻不計時候分溫二服

知母散

出聖
惠方

治熱病三日經發汗熱退後尚寒熱往

來不能飲食宜服

知母

一兩

枳實

麩炒
微黃

梔子仁

各一
兩半

右為散每服五錢用水一大盞入豉少許煎至五分

去滓不計時候溫服

熱病四日

論

夫熱病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病
訖傳入于陰故毒氣入于胃膈其病咽喉乾胃膈滿故
可吐而愈也

方

苦參散

出聖惠方

治熱病四日結胃滿痛壯熱身體疼痛

宜服令吐

苦參劉恒山

各半兩

右為散以水二中盞煎至一盞去滓不計時候盡飲之當吐即愈未吐再服

瓜蒂散

出危氏方

治熱病四日咽喉乾而腹滿曾有寒痰

當吐諸亡血虛家不可與服

瓜蒂一分赤小豆一分

兩

右搗粗羅為散每服二錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服以吐為度一方用香豉半合同煎

服一方治內傷為細末溫水調一錢以吐為度如傷之太重備急丸獨行丸皆急藥也倉卒無藥糟瓜頓喫亦一吐

柴胡散

出聖惠方

治熱病四日壯熱四肢沉重喫食不下

宜服

柴胡

去苗

葛根

剉

川大黃

剉碎微炒

石膏

前胡

去蘆頭

鱉

甲

塗醋炙微黃去裙襴各一兩

赤芍藥

黃芩

各三分

梔子仁

甘草

炙微赤剉各半兩

川朴硝

一分

右粗搗羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去

滓不計時候溫服

麻黃散

出聖惠方

治熱病四日毒氣內攻身體痛壯熱頭

重煩渴不止宜服

麻黃

去根節

茵陳

菰蘆根

各一兩

桂心

細辛

紫

胡

去苗甘草

炙微赤剉各半兩

川大黃

三分剉碎微炒

右粗搗羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去

滓不計時候溫服

葛根散

出聖惠方

治熱病四日發汗不差身體壯熱心膈

煩悶不得睡卧宜服

葛根

剉

石膏

各二兩

龍膽草

去蘆頭

大青

桂心

甘

草

炙微赤剉各半兩

麻黃

去根節

葳蕤

赤芍藥

黃芩

川升麻

各一兩

右為粗散每服四錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

竹茹散

出聖惠方

治熱病四日頭痛胃滿食即嘔逆宜服

竹茹

陳橘皮

湯浸去白瓢焙

葛根

剉

人參

去蘆頭

蘆根

剉

一枇杷葉

半兩拭去毛炙微黃

右為粗散每服五錢以水一大盞入粳米一百粒生

薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

人參散

出聖惠方

治熱病四日熱毒解後時來時往惡寒

微熱不能食宜服

人參

去蘆頭

知母

枳實

麩炒令微黃

陳橘皮

湯浸去白瓢炒

梔

子仁

檳榔

甘草

炙微赤剉各一兩

豉

三兩微炒變色

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

熱病五日

論

失熱病五日少陰受病毒氣入于腹胃其病口熱舌乾渴而引飲故可下而愈也

方

大黃散

出聖惠方

治熱病五日口苦舌乾煩熱頭痛不解

者宜服

川大黃

剉碎
微炒

石膏

各一兩

黃連

去
積

甘草

炙微
赤剉

黃蘗

剉

梔子仁

各半兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入葱白一莖豉五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

柴胡湯

出聖
惠方

治熱病五日壯熱骨節煩疼目眩脇下

脹痛不能飲食欲便成黃宜服

柴胡

去
苗

枳實

麩炒令
黃色

知母

黃芩

梔子仁

麥

門冬

焙去心

龍膽草

去蘆頭

川大黃

剉碎微炒

甘草

炙微赤剉各一

兩

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

黃芩散

出聖惠方

治熱病五日頭痛壯熱骨節疼痛宜服

黃芩

梔子仁

前胡

去蘆頭

赤芍藥

各一兩

甘草

半兩

炙微赤剉

石膏

二兩

右為散每服五錢以水一大盞入豉半合煎至五分

去滓不計時候溫服

柴胡飲子

出聖惠方

治熱病五日已得汗毒氣不盡猶作

寒乍熱惛惛如醉脇下牢滿骨節疼痛不能下食舌本乾燥口内生瘡宜服之

柴胡

去苗

麥門冬

去心

竹葉

各二兩

川升麻

黃芩

枳

殼

麴炒黃去蘗各一兩半

赤芍藥

甘草

炙微赤剉

梔子仁

各一兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞入豉五十粒蔥白一莖煎至五分去滓不計時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治熱病五日頭痛身疼皮肉如火心

膈煩躁

麥門冬

去心焙

石膏

川朴硝

各二兩

赤芍藥

犀角

屑

黃芩

各一兩

梔子仁

地骨皮

甘草

炙微赤剉各半兩

兩

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

茵陳散

出聖惠方

治熱病五日未解頭痛壯熱眼睛疼心

腹痛宜服

茵陳

川大黃

劉碎微炒
各半兩

梔子仁

黃芩

柴胡

去苗木通

劉

川升麻

赤芍藥

蘇蘇根

各一兩

右為粗散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

熱病六日

論

夫熱病六日厥陰受病氣入于腸胃其人煩滿而陰縮

故可下而愈也

方

大青飲子

出聖惠方

治熱病六日不解通身肉熱毒氣令

人更相染著宜服

大青

生地黃

各二兩

石膏

三兩

香豉

二合

葛根

剉

梔子

仁

各一兩

川芒硝

三兩

甘草

半兩炙

微赤剉

右都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去

滓不計時候溫服

驚甲散

出聖惠方

治熱病六日熱勢彌固大便悶澀心腹

痞滿食飲不下精神昏亂恍惚狂言其脉洪數宜服

驚甲

塗醋炙令黃去裙襴

羚羊角屑

赤茯苓

白鮮皮

枳殼

麩炒微黃去穢

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

茵陳

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

川大黃

二兩剉碎微炒

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

梔子散

出聖惠方

治熱病六日胃中痞熱皮膚赤黃心身

煩悶大小便不利宜服

梔子仁 葛根剉 茵陳 土瓜根 川升麻 川

大黃剉碎
微炒 川芒硝 木通剉各
一兩 甘草半兩
炙

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

石膏散

出聖
惠方

治熱病六日不解壯熱頭疼小便赤澀

口内生瘡粥食不下宜服

石膏 知母 柴胡去
苗 秦艽去
苗 木通剉各
一兩 梔子仁

一兩 麥門冬 去心 黃連 去鬚 甘草 炙微赤
半 三分 劉半兩

右為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓入蜜
一合攪令勻更煎三沸取溫慢慢含嚥之

苦參湯 出千金方 治熱病五六日已上

苦參 三兩 黃芩 二兩 生地黃 八兩

右咬咀以水八升煎取二升適寒溫服一升日再服
或吐下毒則愈

熱病七日

論

夫熱病七日三陰三陽傳病訖病法當愈今病不除者欲為再經病也再經病者謂經絡重受也

方

半夏散

出聖惠方

治熱病七日煩躁而渴胃中痰熱宜服

半夏

湯洗七遍去滑

前胡

去蘆頭

黃芩

麥門冬

去心焙

蘇蘇

根

赤茯苓

甘草

炙微赤剉各半兩

赤芍藥

人參

去蘆

頭

知母

黃耆

剉各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入粳米小麥各一百粒生薑半分去滓不計時候溫服

前胡散

出聖惠方

治熱病七日不解寒熱往來胃脇苦滿

不思飲食心煩欲吐宜服

前胡

去蘆頭

半夏

湯洗七遍去滑

甘草

炙微赤剉各半兩

黃芩

人

參

去蘆頭

赤芍藥

桂心

各三分

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

地骨皮散

出聖惠方

治熱病七日遍身疼痛壯熱不解宜

服

地骨皮

枳殼

麩炒微黃去瓢

川大黃

剉碎微炒

柴胡

去苗 鱉甲

塗醋炙令黃去裙襴

麥門冬

去心焙各一兩

赤芍藥

甘草

炙微赤剉各半兩

兩

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

生地黃煎

出聖惠方

治熱病七日或寒或熱來去不定腹

中虛熱毒氣不退心神不安宜服

生地黄汁

半升

生麥門冬

半升

人參

去蘆頭

白朮

肉桂

心

甘草

炙微赤剉

川升麻

各一兩

蜜

半升

地骨皮

二兩

石膏

三萆菜心

切半

右都剉以水三大盞煮至一椀絞去滓下蜜地黄麥門冬汁三味同熬令稀稠得所放冷不計時候每服取半合服之

驚甲散

出聖惠方

治熱病七日四肢疼痛熱毒不退乍寒

乍熱乍劇乍差發動如瘡宜服

驚甲

二兩 塗醋炙
令黃去裙襴

天門冬

去心

人參

去蘆頭

黃耆

剉

烏

梅肉

微炒

恒山

牛膝

去苗

甘草

炙微赤剉

石膏

三兩

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片豉五

十粒煎至五分去滓不計時候溫服

治時行熱病發汗有功

本草

浮萍草

一兩四月
十五者

麻黃

去根節

桂心

附子

炮裂去
皮臍各

一兩

右四物搗細節每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差

熱病頭痛

論

夫熱病三陽受病猶在于表邪毒之氣攻注于外循于風府而入于腦故令壯熱頭痛胃膈壅滯其脉浮數者可汗及吐之即愈也

方

石膏散

出聖惠方

治熱病壯熱頭痛百脊痠疼宜服

石膏

二兩麻黃

去根節

葛根

剉各一兩

黃芩

梔子仁

赤

芍藥

各三分

甘菊花

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入豉少半合煎至六

分去滓不計時候溫服

犀角散

出聖惠方

治熱病四肢煩悶壯熱頭痛口舌乾燥

宜服

犀角屑

一人

麥門冬

去蘆頭

赤茯苓

各三兩

甘草

各三兩

炙微 知母 石膏
赤剉 各半 兩

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二十七片煎至五分去滓不計時候溫服

葛根散

出聖應方

治熱病頭痛骨節煩疼宜服

葛根

剉

赤芍藥

甘菊花

黃芩

各一兩

石膏

二兩

草

一分炙微赤剉

防風

半兩去蘆頭

右為散每服四錢水一大盞生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服

取吐散

出聖惠方

治熱病頭痛四肢煩疼宜服

人參蘆頭

恒山

鰲甲

塗醋炙令黃去裙襴各半兩

柴胡去苗

茵陳 川大黃

劉碎微炒各一分

右為散每服四錢水一中盞入豉五十粒煎至五分

去滓不計時候頓服取吐為度

瓜蒂散

出聖惠方

治熱病頭痛宜用吹鼻

瓜蒂 赤小豆

微炒

麝香

細研

丁香

各一分

馬牙硝

半兩

右為細散入麝香都研令勻以少許吹入鼻中當下

黃水即差

治熱病頭疼不止方

出聖
惠方

石膏

二兩

芎藭

半兩

馬牙硝

一兩

右為粗散每服三錢以水一大盞入生薑半分細茶末一錢煎至七分去滓不計時候分溫二服

治熱病頭痛不可忍方

出聖
惠方

地龍

一條
細研

沙糖

三棗
大

右相和以水一大盞調以瓷瓶盛懸于井內去水相

近一炊時出傾取清者不計時候都為一服勿令患人知之

灌頂散

出聖惠方

治熱病頭疼不可忍

馬牙硝

苦葫蘆子

地龍

乾者

瓜蒂

各一分

麝香

半錢

細研

右為細散入麝香同研令勻吹一字于鼻中當下腦中惡滯水便差

治熱病頭痛不可忍方

出聖惠方

右相和細研入清麻油調令如膏塗于頭上立差神効

治熱病頭疼發熱進退方

出聖惠方

用蘇蘇一枚大者取瓢細剉置甕中用熱酒一盞沃蓋之良久去滓不計時候頓服未効再服一方用熱湯沃之

熱證防風散

出危氏方

治積熱上衝頭熱如火痛入頂中

防風

去蘆

羌活

去蘆

薄荷

去麤梗

當歸

去尾

大黃

梔子

去鬚

川芎

各一兩

蟬退

二十箇去足翼

粉草

五錢

右為散每服四錢水一盞半燈心二十莖苦竹葉十

皮煎食後服

治熱病結胃其心前閉塞胃中有一塊堅硬通身發熱
頭痛不安面色黧赤喉中涎溢大腑秘熱昏悶不醒
人事此病與伏暑相似若是伏暑即不可喫此藥伏

暑候在總論中見

楊子建萬金護命方

射干

麻黃

去根節

牡丹皮

去心桃仁

大黃

赤茯苓

苓

各半兩

半夏

三株

牽牛

一兩

羌活

連翹

荊芥穗

各半

兩

右細杵羅為末每服三錢水一盞煎取九分食後和

滓喫

熱病煩躁

論

夫熱病煩躁者為陽勝于陰熱氣獨盛痞結于臟則三焦隔絕故身熱而煩躁也

方

龍膽散

出聖惠方

治熱病未得汗體熱煩躁宜服

龍膽草

葳蕤

赤芍藥

黃耆

剉

麻黃

去根節

大

青川升麻

甘草

炙微赤剉各三兩

葛根

剉

桂心

各半兩

石膏

二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

白鮮皮散

出聖惠方

治熱病熱毒在心脾狂亂煩躁宜服

白鮮皮

麥門冬

去心焙
各一兩

川大黃

剉碎
微炒

大青黃

苓

甘草

各半
兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎至六分去滓不計時候溫服

葛根飲子

出聖
惠方

治熱病頭痛目疼心中煩燥宜服

葛根

剉赤芍藥

豉

各半
兩

葱白

三
莖

右都以水一大盞半煎至一盞去滓不計時候服

解毒飲子

出聖
惠方

治熱病初覺煩燥頭疼腰痛宜服

生地黄汁

合三

黃芩

生薑

各一兩

白蜜

半匙

右細劉黃芩生薑二味以水一大盞煎至六分次入地黃蜜更煎三兩沸不計時候分溫二服

犀角散

出聖惠方

治熱病經發汗熱不解心中燥熱煩悶

宜服

犀角屑

半兩

天竺黃

一分

馬牙硝

鉄粉

鉛霜

各一兩

麝香

半錢

右都研為細散每服不計時候以竹葉湯溫溫調下

二錢

白鮮皮散

出聖惠方

治熱病心神煩燥不止宜服

白鮮皮

一兩

梔子仁

麥門冬

去心焙

川大黃

剉碎微炒

鬱

金

黃芩

甘草

炙微赤剉各三分

鉛霜

一分細研

右為細散入鉛霜同研令勻每服不計時候熟水調

下二錢

黃芩散

出聖惠方

治熱病熱毒不解口乾煩燥宜服

黃芩

川大黃

剉碎微炒

甘草

炙微赤剉

川馬牙硝

各一兩

鉄

粉半分 梔子仁兩半

右為細散每服不計時候以溫溫蜜水調下二錢

治熱病吐下水及下利身冷脉微發燥不止

用附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水二升煎一升溫服立効

芍藥黃耆湯

十便良方

療陰不足則陽偏陽偏則發熱若

熱從背起或從手足漸痛遍身口舌乾燥思欲飲水時時燥悶此由陰氣虧少少水不能滅盛火蓋諸陽

起四末循行于背陰不能斂陽所以發熱或晝發而
夜止或夜發而至旦即清其脉虛疾而小宜服此

白芍藥

三兩

黃耆

甘草

青蒿

各一兩

右為粗末每服五錢以水二盞煎至一盞去滓不計
時候溫服

熱病狂言

論

夫熱病毒氣攻心則心胃煩亂陽氣太盛遂則狂言目

赤心煩不得睡卧精神驚悸言語失常毒氣不除腸中結燥其脉洪數者是其候也 夫病熱盛則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽氣爭而外并于陽四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高而歌熱盛于身則棄衣而走陽盛故妄言罵詈不避親疎大熱遍身狂言而妄見妄聞也

方

大柴胡散

出聖惠方

治熱病已得汗熱猶不解腹脹煩燥

狂語不定可服

柴胡

去苗

川大黃

劉碎微炒

黃芩

赤芍藥

枳實

麩炒微黃

人參

去蘆頭

黃耆

劉各一兩

甘草

炙微赤劉

半夏

湯浸七遍去滑各半兩

右為粗散每服五錢以水一大盞入竹茹一分生薑

半分煎至五分去滓不計時候溫服

猪苓散

出聖惠方

治熱病狂言煩渴宜服

猪苓

去黑皮

麥門冬

去心焙各一兩

龍膽草

去蘆頭

黃芩

白

鮮皮 澤瀉

赤茯苓

人參

去蘆頭

甘草

炙微赤 剉各三

分

右為粗散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

白鮮皮散

出聖惠方

治熱病狂言不止宜服

白鮮皮

黃芩

秦艽

去苗

犀角屑

甘草

炙微赤剉

麥

門冬

去心

大青

杏仁

湯浸去皮尖雙仁 麩炒微黃各半兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

龍齒散

出聖惠方

治熱病心肺熱壅狂言不安宜服

龍齒

人參

去蘆頭

川大黃

剉碎微炒

川芒硝

各一兩

白鮮

皮

川升麻

葳蕤

秦艽

去苗各三分

石膏

一兩半

右為散每服五錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

治熱病熱毒攻心煩燥狂言精神不定

出聖惠方

生地黄汁

合三

生薑汁

合一

薄荷汁

合一

白蜜

合一

地龍

兩半

微炒去土搗
細羅為末

右以四味汁相和入地龍末攪令勻不計時候分溫

二服

治熱病煩熱如火狂言妄語欲走宜服此方

出聖
惠方

黃芩

甘遂

煨令
黃

龍膽草

去蘆頭
各一兩

右為細散每服不計時候以溫水調服二錢須臾令
病人飲水三兩盡服滿則吐之此方療大熱急者甚

効

治熱病五六日壯熱狂語欲走

出聖惠方

雞子

三枚取清

川芒硝

細研

寒水石

細研各半兩

右先以新汲水一小盞調芒硝等末次下雞子清攪令勻不計時候分為二服

牛黃丸

出聖惠方

治熱病狂言心神驚悸煩熱喘促宜服

牛黃

細研

麝香

細研各一兩

犀角屑

人參

去蘆頭

茯神

胡黃連

龍膽草

去蘆頭

木香

羚羊角屑

朱砂

細研地骨皮

川升麻

甘草

炙微赤剉各一兩

麥門冬

一兩

去心 龍腦一錢
焙 細研

右為末都研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以新汲水下十五丸

治熱病狂語及諸黃雪煎

出聖惠方

川大黃

五兩碎劉微炒

右為細散用臘月雪水五升煎如膏每服不計時候以冷水調半匙服之

若已六七日熱極心下煩悶狂言見鬼欲起走

出肘後方

右用乾菜萸三升水二升煮取一升後去滓寒溫服之得汗便愈此方恐不識必可用也秘之

又方

肘後方

大蚓一升破去土以人溺煮令熟去滓服之直生絞汁及水煎之並善又絞冀汁飲數合至三升謂之黃龍湯陳久者佳

又方

肘後方

取白犬從背破取血用之多多為佳當及熱以鋪胃

上冷乃去之此治垂死者活無白犬諸純色者亦可用之無犬白雄雞佳

又方

肘後方

取桐皮削去上黑者細擘之長斷令四寸一束以酒五合以水一升煮取一升去滓頓服之當吐下青黃汁數升即差

治時疾熱病狂言心燥

出本草

以苦參不限多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎

至八分溫服連三服有汗無汗皆差

治熱病煩渴

論

夫熱病入于腎臟則為煩渴為腎惡燥也令熱氣盛攻于腎故腎燥腎燥則渴而引飲也

方

麥門冬散

出聖惠方

治熱病經吐下後有熱毒未解煩渴

不止宜服

麥門冬

去心焙

赤芍藥

黃連

去鬚

甘草

炙微赤剉

知母

黃芩

猪苓

去黑皮各一兩

薤白

一枚

右為粗散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

黃耆散

出聖惠方

治熱病煩渴日夜喫水宜服

黃耆

剉

麥門冬

去心

薤白根

各一兩

甘草

半兩剉生用

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

石膏茶方

出聖
惠方

治熱病頭疼壯熱心躁煩渴宜服

石膏

二兩
搗碎

淡竹葉

一握

薺芫

木通

各半
兩

右細剉以水二大盞煎至一盞去滓分作四度點臘

面茶不計時候服

犀角飲子

出聖
惠方

治熱病煩渴飲水無度宜服

犀角屑

知母

川升麻

各三分

石膏

二兩

右細剉用水二大盞入竹葉三七片小麥五十粒煎

至一盞去滓入土瓜根汁一合蘇蘇根汁一合攪令

勺不計時候分溫二服

又方

出聖惠方

小麥

合麥門冬

二兩去心

寒水石

青竹葉

知母

各三

分

右細剉和勻分為五服每服以水二大盞煎至一盞

去滓每服渴時溫服半中盞

知母散

出聖惠方

治熱病積熱攻脾肺煩燥多渴飲水無

度小便數宜服

知母

川大黃

劉微炒

黃芩

麥門冬

去心

龍膽草

去蘆

頭各三分

甘草

一分炙微赤到

右為散每服四錢以水一中盞入生蘆根五寸煎至

五分去滓不計時候溫服

治熱病煩懽大渴飲水則逆宜此方

出聖惠方

木瓜

生薑

薄荷

各一分

右都細切以水一大盞煎至五分去滓入蜜一合攪

勻不計時候溫服

黃芩散

出聖惠方

治熱病煩渴不止兼除勞熱宜服

黃芩

一兩

黃連

去

生乾地黃

川升麻

知母

葛

根

判

大青

各半兩

梔子仁

一分

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

人參散

出聖惠方

治熱病經吐下後有餘熱煩渴不止宜

服

人參

去蘆頭

黃連

去

甘草

炙微赤判

各三分

黃芩

蘇蘇根

各一
兩 桂心 兩半

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治熱病煩渴不止宜服

麥門冬

一兩半
去心焙

甘草

炙微赤劉

地骨皮

知母

土瓜

根

各一
兩 豉一
合

右為粗散每服五錢水一大盞入葱白兩莖生薑半

分煎至五分去滓不計時候溫服

猪苓散

出聖惠方

治熱病煩渴不止或時頭痛乾嘔宜服

猪苓

去黑皮

人參

去蘆頭

甘草

炙微赤剉

茅根

剉各三分

麥門冬

一兩去心

石膏

二兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

石膏散

出聖惠方

治熱病毒氣在心煩渴不止宜服

石膏

四兩

麥門冬

去心

黃芩

梔子仁

地骨皮

柴

胡

去苗

荪蘆根

葳蕤

甘草

炙微赤剉各三分

右為散每服五錢水一大盞入竹葉三七片煎至五

分去滓不計時候溫服

地骨皮散

出聖惠方

治熱病煩渴不止宜服

地骨皮

澤瀉

麥門冬

去心各一兩

梔子仁

犀角

屑黃芩

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

猪苓散

出聖惠方

治熱病發熱煩渴小便不利宜服

猪苓

去黑皮

赤茯苓

木通

剉

滑石

澤瀉

各一兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

牛黃散

出聖惠方

治熱病大熱煩渴心慄不睡宜服

牛黃

一分細研

柴胡

去苗

黃連

去鬚

黃芩

葛根

剉各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為細散不計時候以薄荷水調下二錢

三黃丸

出聖惠方

治熱病煩渴諸臟不安宜服

方見本門熱病大便

不通
類

又方

出聖
惠方

右以生地黄搗絞取汁每服一合時時服之

又方

出聖
惠方

右以生蓀蘆根搗絞取汁每服一合時時服之

熱病喘急

論

夫熱病毒氣攻于心肺煩熱壅于胃膈而渴引飲水必

致喘粗汗下之後胃氣尚虛熱毒不退渴飲水過多水
停心下故令喘急也

方

前胡散

出聖惠方

治熱病氣喘心膈煩悶或痰壅不能食

宜服

前胡

去蘆頭

赤茯苓

紫苑

去根土

大腹皮

剉

桔梗

去蘆

頭枳殼

麩炒微黃去
新各一兩

麥門冬

一兩半
去心焙

甘草

炙微
赤剉

陳

橘皮

湯浸去白
焙各三分

右為粗散每服五錢水一大中盞煎至五分去滓不

計時候溫服

大腹皮散

出聖惠方

治熱病肺壅氣喘膈中不利宜服

大腹皮

剉

人參

去蘆頭各一兩

赤茯苓

枳實

麩炒微黃

柴胡

去苗桑根白皮

剉各三分

右為散每服四錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

杏仁散

出聖惠方

治熱病胃膈煩悶喘息奔急宜服

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

前胡

去蘆頭

甘草

炙微赤剉

麥門冬

去心桑根白皮

剉各一兩

木通

半兩剉

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

治熱病心膈煩熱肺壅喘急宜服此方

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

麥門冬

去心各一兩

馬兜鈴

半兩

黃節

去根

五味子

各一兩半

桑門冬

三分

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

柴胡散

出聖惠方

治熱病肺熱上氣奔喘宜服

柴胡

去苗

紫蘇莖葉

桑根白皮

剉

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩

炒微黃各一兩

陳橘皮

一兩半湯浸去新焙

石膏

二兩

麻黃

半兩去根節

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

半夏散

出聖惠方

治熱病客熱在臟乾嘔口中多痰喘急

煩悶不能飲食宜服

半夏

湯洗七遍去滑

麥門冬

去心

青竹茹

葛根

各一兩

甘草

炙微赤剉

陳橘皮

湯浸去白瓢焙各半兩

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分

去滓不計時候溫服

治熱病飲水多卒上氣喘急方

出聖惠方

淡竹葉

一兩半

陳橘皮

半兩湯浸去白瓢焙

桑根白皮

剉一兩

右為細剉和勻分為五服每服以水一大盞煎至五

分去滓不計時候溫服

阜英丸

出聖惠方

治熱病肺壅喘急宜服

阜英

一兩去黑皮塗酥炙微黃

郁李仁

湯浸去皮尖研如膏

甘草

炙微赤剉

麻

黃

去根節各三分

甜葶藶

一兩炒令黑搗如泥

右為末用郁李仁葶藶同研令勻煉蜜和丸如梧桐

子大每服不計時候以粥飲下十丸

杏仁煎

出聖惠方

治熱病氣喘咳嗽宜服

杏仁

五兩湯浸去皮尖雙仁

黃牛酥

二兩

白蜜

半斤

生薑汁

二合

右以酥拌杏仁炒令黃熟搗如膏入蜜薑汁同煎如

稠飴每服三錢含嚙津不計時候服

陷胃散

出聖惠方

兼治心胃悶結喘不定服之自汗出

大黃

一兩半

甘草

半兩

枳實

半兩去瓢

右為末每服三錢水七分一盞煎三兩沸溫溫和平服汗出為度六日內多使此散如無證不用

熱病發狂

論

夫心者火也主于血陽氣盛則血并于陽熱邪攻于心

絡則心神煩亂或詠或歌或言或笑精神不守言語失常驚悸不安棄衣而走此皆熱毒之氣壅滯心胃致令發狂也

方

犀角散

出聖惠方

治熱病伏熱在心精神恍惚發狂不得

睡卧宜服

犀角屑

梔子仁

各半兩

茵陳

三分

赤芍藥

麥門冬

去心白鮮皮

各一兩

茯神

生乾地黃

各二兩

人參

一兩半去

蘆頭

右為散每服五錢水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服

人參散

出聖惠方

治熱病壅熱發狂心忪驚悸宜服

人參

去蘆頭三分

犀角屑

甘草

炙微赤剉

黃芩

遠志

秦艽

去苗

地骨皮

沙參

去蘆頭各半兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓下竹

瀝一合攪令勻不計時候溫服

羚羊散

出聖惠方

治熱病發汗後熱毒未盡因有所驚發

熱顛狂宜服

羚羊角屑

犀牛角屑

茯神

黃芩

甘草

炙微

赤防風

去蘆頭各半兩

龍齒

人參

去蘆頭

鉄粉

各一兩

地骨

皮

三分

右為麤散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不

計時候溫服

茯神散

出聖惠方

治熱病發狂心熱煩悶多驚不得睡卧

宜服

茯神

黃芩

各三分

犀角屑

川升麻

玄參

各半兩

龍齒

麥門冬

去心

甜竹根

剉

黃連

去鬚各一兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓下朴

硝一錢地黃汁一合攪令勻不計時候溫服

大青散

出聖惠方

治熱病盛發黃皮膚如金色小便赤澀

大便不通口乾煩渴悶亂發狂宜服

大青

黃藥子

川朴硝

川大黃

剉碎微炒

羚羊角

屑 土瓜根 梔子仁 秦艽去苗 甘草炙微赤剉各半兩

右為細散不計時候以冷蜜水調下二錢以利為度

柴胡散

出聖惠方

治熱病已得汗熱不解腹滿脹痛煩燥

發狂宜服

柴胡

去苗一兩

川大黃

剉碎微炒

黃芩

赤芍藥

半夏

浸湯

七遍去滑各三分

枳殼

半兩麩炒微黃去瓢

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

朱砂丸

出聖惠方

治熱病毒熱在臟心神狂亂壯熱煩燥

不得睡卧宜服

朱砂

細研

紫石英

細研水飛過

白石英

細研水飛過

不灰木

以牛

糞火燒一炊時各一兩

太陰玄精石

牛黃

天南星

末生用

麝香

各半兩

金箔

五十片

龍腦

一分

右都研令細用牛膽汁和丸如櫻桃大不計時候以

新汲水嚼下一丸

鐵粉丸

出聖惠方

治熱病心神恍惚悲喜不恒發狂欲走

宜服

鉄粉

細研

牛黄

細研

遠志

去心

丹參

茯神

川升麻

各半

兩

金箔

三七片
細研

銀箔

三七片
細研

麝香

細研

白殭蠶

微炒

白

附子

炮裂各
一分

馬牙硝

三分
細研

右為散同研令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大不計時候以薄荷湯下二十丸

牛黄丸

出聖
惠方

治熱病發狂心神恍忽宜服

牛黄

半兩
細研

虎睛

一對酒
浸微炙

茯神

石膏

細研

麥門冬

去心

生乾地黄

鉄粉

細研各一兩

川升麻

玄參

各三分

右為末同研令勻煉蜜丸如梧桐子大不計時候以荊芥湯下二十丸

天竺黃丸

出聖惠方

治熱病心氣熱盛恍惚不定發狂妄

有所見宜服

天竺黃

朱砂

細研水飛過

龍腦

各三分

牛黃

細研

遠志

去心

麝香

細研

甘艸

炙微赤剉各一分

黃連

去鬚

鉄粉

各一兩

甘菊

馬牙硝

細研

茯苓

各半兩

金銀箔

各五十片細研

右為末都研令勻煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子
大不計時候以荊芥湯或薄荷湯嚼下十九

治熱病毒攻心胃躁悶發狂

出時
後方

雞子

二枚
清

川朴硝

兩半

右相合以新汲水一小盞熱調頓服之一方酒服之
治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癇言語不定久不
得汗及不知人事

右用人中黃不拘多少入大罐內以泥固濟大火煨

半日去火候冷取出于地上以盆蓋之又半日許細研如麴新汲水調下三錢或未退間作差人中黃者硬糞也

治狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無時用

出本

草

以豕猪肉一斤煮令熟令以細研作膾和醬醋食之或羹粥炒任性服之

解熱病不知人事欲死者

用蚯蚓不拘多少先杵爛以水泡濾過灌服半碗立効

熱病嘔逆

論

夫熱病胃中有熱則穀氣不和新穀入與熱氣相搏胃氣不平故致嘔逆或吐下已後臟氣虛弱亦令嘔逆也

方

前胡飲子

出聖惠方

治熱病惡寒壯熱食則嘔逆宜服

前胡

去蘆頭

麥門冬

去心

竹茹

生地黃

葛根

各二兩

陳橘皮

湯浸去白瓤焙

甘艸

炙微赤剉

枇杷葉

拭去毛炙微黃各半兩

右都細剉和勻每服五錢以水一大中盞煎至五分

去滓不計時候溫服

人參飲子

出聖惠方

治熱病壯熱嘔逆不下飲食宜服

人參

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白瓤焙

生薑

赤茯苓

麥門

冬

去心

葛根

各一兩

右都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去

滓不計時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治熱病壯熱惡寒食即嘔逆宜服

麥門冬

去心

前胡

去蘆頭

生地黃

各一兩

甘草

炙微赤剉

陳橘

皮

湯浸去白瓢焙

人參

去蘆頭各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入竹茹半雞子大煎

至六分去滓不計時候溫服

柴胡散

出聖惠方

治熱病數日未得汗遍身壯熱嘔逆不

下食宜服

柴胡去苗 川升麻

人參去蘆頭

麥門冬去心各一兩 麻黃

一兩半 甘草炙微去根節

枳實炙炒微黃

知母 梔子仁各三兩

鰲甲

三兩塗醋炙令黃去裙襴

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

白茅根飲子

出聖惠方

治熱病因服涼藥過多致胃冷嘔

宜服

白茅根

半兩剉

陳橘皮

湯浸去白瓤焙

桂心

葛根

高良

薑兩 枇杷葉

半兩 拭去毛 炙微黃

右都細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病煩渴飲水過多時有嘔逆方

出聖惠方

枇杷葉

拭去毛 炙微黃

茅根

剉各一兩

右為散以水三大盞煎至一盞半去滓不計時候分

溫三服

七物黃連湯

出聖惠方

治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人

喜煩嘔逆支滿劇如禍祟寒熱相搏故令喜煩

黃連

茯苓

黃芩

各十八銖

芍藥

葛根

各一兩

甘州

一兩六銖

小麥

三合

右呖咀以水七升煮取三升冷分三服不能一升稍
稍服之湯勢安乃卧藥主毒氣服湯之後胃中熱及
咽喉痛皆差其明日復煮一劑如法服之此湯無毒
但餘熱下氣安病人小兒服者取三分三一以水四
升煮得二升稍稍服

黃連解毒湯

出經驗良方

治煩嘔不得眠口燥呻吟錯語

黃連

三兩

黃柏

黃芩

各二兩

梔子

十四枝

右水六升煎取二升分再服外臺云凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠皆傳此方諸人用之亦効此直解熱毒除熱酷不必飲酒劇者一方每服加半夏三枚全用厚朴二錢剉茯苓去皮剉水一盞半生薑三片煎至半盞溫服名曰半夏黃連解毒湯或欲急下者本方加大承氣湯一服生薑煎如前法以利為度一

法為細末水丸如小豆大溫水下二十九丸治積熱勞
效瀉利甚良

小柴胡湯

出朱氏
律驗方

治熱證嘔吐

柴胡

去蘆
半斤

黃芩

人參

甘草

炙各
三兩

半夏

湯洗七
次焙乾

二兩
半

右剉散每服三錢半生薑五片棗一枚煎服

熱病噦候

論

夫熱病噦者由伏熱在于胃間令人胃滿氣逆則噦若
大下後胃氣虛冷亦致噦也

方

丁香散

出聖惠方

治熱病未得汗躁熱飲水過多腹脹氣

急嘔噦不止宜服

丁香

陳橘皮

湯浸去白新焙

枇杷葉

拭去毛炙微黃

前胡

去蘆頭

葛根

劉各半兩

人參

茅根

劉各一兩

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候溫服

甘草飲子

出聖惠方

治熱病毒氣攻胃嘔噦不止宜服

甘草

炙微赤

陳橘皮

湯浸去白瓤焙

川升麻

生薑

葛根

剉人參

去蘆頭各一兩

右都剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去

滓不計時候溫服

半夏散

出聖惠方

治熱病腹胃虛脹心膈壅滯嘔噦不能

食宜服

半夏

湯洗七遍去滑

赤芍藥

陳橘皮

湯浸去白瓢焙

大腹皮

剉各

三分

右為粗散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治熱病煩熱嘔噦不欲飲食宜服

麥門冬

去心

蘆根

剉各一兩半

柴胡

去苗

葛根

剉各一兩

人參

三分

去蘆頭

右為散每服四錢以水一中盞入竹茹一分煎至六

分去滓入生地黃汁少半合更煎一沸不計時候溫服

前胡散

出聖惠方

治熱病胃中有熱穀氣入則胃逆逆則

胃不下食宜服

前胡

去蘆頭

黃耆

剉

人參

去蘆頭各一兩

麥門冬

去心

陳橘皮

湯浸去白瓢焙各半兩

甘艸

一分炙微赤剉

生乾地黃

三分

右為散每服五錢以水一大盞入竹茹一分去滓不計時候煎至五分溫服

赤芍藥散

出聖
惠方

治熱病往來寒熱胃脇滿悶噦逆宜

服

赤芍藥

人參

去蘆
頭

陳橘皮

去白
瓤焙

茯苓

各三
分

前胡

去蘆
頭

桂心

犀角屑

大腹皮

蘆根

各半
兩

右為散每服三錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

白木香散

出聖
惠方

治熱病邪熱已退胃氣未和噦不能

食宜服

白木香

蘆根

剉

草豆蔻

去皮

人參

去頭

蘆

陳橘皮

湯洗

去白

枇杷葉

拭去毛

厚朴

去粗皮

塗生薑汁

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

白茅根散

出聖惠方

治熱病噦逆不下食宜服

白茅根

剉

百合

陳橘皮

湯浸去白

葛根

剉

人參

去蘆

頭各一分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治熱病未得汗嘔噦不止方

出聖惠方

麥門冬

一兩半
去心焙

蘆根

人參

去蘆頭
各一兩

右為散每服半兩以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

熱病汗後餘熱不退

論

夫熱病其人或未發汗吐下或經服藥已後而脉洪大

實數腹胃脹滿小便赤黃大便難或渴或煩面色變赤
此為腑臟有結熱故也

方

石膏散

出聖惠方

治熱病得汗後餘熱不退頭痛心煩宜

服

石膏

二兩

麥門冬

一兩去心焙

知母

人參

去蘆頭

柴胡

去苗

犀角屑

甘艸

炙微赤剉各半兩

黃芩

三分

右為粗散每服五錢以水一大盞入葱白兩莖豉五

十粒煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病汗後餘熱不除寒熱往來頭重體痛宜服此方

出聖
惠方

葛根

剉

黃耆

剉

梔子仁

柴胡

去苗

石膏

各一兩

地骨

皮

黃芩

各三分

甘艸

半兩炙
微赤剉

右為粗散每服三錢以水一中盞入豉三十粒煎至

五分去滓不計時候溫服

茵陳散

出聖
惠方

治熱病汗後餘熱不解頭項出汗身上

無汗痰熱在內渴欲飲水小便不利宜服

茵陳

猪苓

去黑皮

桑根白皮

剉

木通

剉

甘草

炙微赤剉

各半兩

梔子仁

川大黃

剉碎微炒

秦朮

去苗各三分

柴胡

去苗

各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

芎根散

出聖惠方

治熱病汗後餘熱不解往來寒熱不定

宜服

葛根

剉

赤芍藥

各三兩

麻黃

去根節

柴胡

去苗

麥門冬

去心

各一兩

大青

葳蕤

黃芩

甘艸

炙微赤剉各半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

黃芩散

出聖惠方

治熱病後餘熱不解身體沉重宜服

黃芩

川升麻

石膏

麻黃

去根節各一兩

黃連

去鬚三分

梔子仁

甘艸

炙微赤剉各一分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

犀牛角散

出聖惠方

治熱病汗後餘熱不退頭痛唇乾宜

服

犀角屑

知母

川升麻

麥門冬

去心

黃芩

葛

根

剉各一兩

黃連

三分去鬚

甘草

半兩炙微赤剉

石膏

二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

治熱病汗後餘熱不解宜服此方

川升麻

黃芩

各三分

黃連

去鬚

恒山

各一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓空心溫服得吐即止未吐再服

石膏散

出聖惠方

治熱病已得汗餘熱未退宜服

石膏

一兩半

知母

人參

去蘆頭

葳蕤

甘州

三分炙微赤剉

右為粗散每服五錢以水一大盞入生姜半分煎至

五分去滓不計時候溫服

人參散

出聖惠方

治熱病汗後餘熱不除煩躁恍惚不安

宜服

人參

去蘆頭

梔子仁

藍葉

甘艸

炙微赤剉

白鮮皮

大青

各一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴煎方

出千金方

石膏

半斤蜜升

右二味以水三升先煮石膏取二升次內蜜復煎取

如錫舍如棗核許盡復舍之大良

普濟方卷一百五十二